


	初診日	~	検査2日前	検査前日	検査当日(検査前)	検査当日(検査中)	検査当日(検査後)		検査翌日
日付け									
食事	制限はありません。		消化の悪いものは控えて下さい (別紙参照)。	消化の悪いものは控えて下さい (別紙参照)。	朝から絶食です。飲み物は水やお茶など透明なものは飲んでもかまいません。		まず水分をとって吐き気などがないことを確かめましょう。その後検査のみなら、夕食から通常の食事を取ります。		制限はありません。
生活	制限はありません。			制限はありません。	制限はありません。		検査後30分程度は院内で休んでもらいます。 その後は検査のみなら、日常生活の制限はありません。 細胞をとった方は翌日まで激しい運動は控えて下さい。		
検査	必要に応じて血液検査があります。					内視鏡を肛門より大腸の中に挿入します。 病変があれば、組織検査やポリープ切除をします。	ポリベクトミー 		
注射					鎮静剤と鎮痛剤を注射します。				
内服	バイアスピリン・パナルジンなどの内服は検査の5-7日前から中止して下さい		寝る前にブルゼニド3錠を飲みます。	夕食後にラキソベロンを1本飲みます。	自宅あるいは当院で約2時間かけて、下剤を2リットル飲みます。 高血圧などのお薬を飲まれている場合は、当日朝早く(下剤を飲む前に服用して下さい)。				検査のみなら、検査当日夕方からお薬を再開して下さい。 細胞をとった方やポリープを取った方は、バイアスピリンやパナルジン等は検査後3日目から再開して下さい。他の薬は検査当日夕方から再開して下さい。
説明	検査目的・方法・概算費用を説明します。			 			検査結果を説明します。 組織検査をした方は当院の次回説明日の予約を取ります。		